



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώετε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Πλύνετε τα χέρια σχόλιστοκι μετά τον φεκασμό. - Μην φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα απόμετρη προστασία για το μάτι. «Φοράτε κατάλληλα μπότες». - Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες εργάσιου εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον φεκασμό. - Μην ρυπανθείτε τα νερά με το κεύμα σα ή τη συκευασία του. - Για να προστατεύετε φτυά μη στόχους να αφήσετε μια αιφέκστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων.

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΘΟΣ ΜΕ ΤΑΜΑ: Επιπλέοντα προστέκτιμα με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φρακοί επαφής, αφριάστε τους, εφόσον είναι σύνολο. Συνεχίστε να ξελεύνετε. - Εάν δεν υποφέρει ο σφαλμάτης ερήμωσης Συμβουλεύετε / Εποικονωπεύτε γιατρό. ΣΕ περίπτωση επαφής με τα δέρμα: Αφριάστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε κάλι το προσβεβλημένο μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. ΣΕ περίπτωση καπνίσματος: Χορηγήστε επανείλεμμα ενέργη ανόργανο διάλυμα σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μην ρυπανθείτε τίποτα στον πόντονα εάν δεν έχει τις αισθησίες του. Μην προκαλέσετε εμπότισμα. ΣΕ περίπτωση εργάσιμους: Μεταφέρετε το πόντονα από το χώρο της έκθεσης, διατηρώντας το ζεύτη και ξεκούραστο. Απευθύνεσθε προληπτικά σε γιατρό. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδότο. Εφαρμόστε αιμοτηλικό θεραπεία. Η γόηση απροσίστηκε και οξύνεται δεν ενδεικνύεται.

Για τα αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης:

Ειδικές συνήθης γεωργικές, φυτούγεις ή περιβαλλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιείται οποιολατές: Να εφαρμόζονται εναλογικές μεθόδοι αντιμετώπισης ζιζανίων [μηχανική μεθόδος, καλλιέργητη μέτρη, κλπ.] όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την απορρήτη ανάπτυξη ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην δραστική συσία γλυφοσάτων. Σε αρδετικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθύνοντας φεκασμούς των ζιζανίων στα πράσινα, ώστε αναγνοίσια το ψεκαστικό διάλυμα να μην φύσουν στην επιφάνεια του νερού.

Συνδιαστικότητα: Οδηγίες για την ασφαλή απόδυση του φυτοπροστατευτικού πρόδυτον και της συκευασίας: Οι φύλες και τα δογκά έπεινονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ζέλουμα (τα νερά του έπεινομάτος τα ρίχνουμε στο φεκαστικό νερό) και στη συνέχεια αφού κατατροφούν προηγουμένως με τρύπα, για τη διασφάλιση της μη περιπέτεια χρονιών και αποφεύγονται σε ομηρά συλλήψη για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Στοιχεία φυτοτεκνότατος, ευανθίσης ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτεκνότος στις συνιστώνταις καλλιέργειες και δύο διάστημα εφαρμογής.

Τέλευταις επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε πημές): Μηλοερή (Μηλά, Αχλάδι) - Επειρεδοειδή (Πορτοκάλι, Άδαμος, Λεμόνι, γκρέιτ φρουτ, κιτριά - Ακρόδρυο - Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, νεκταρινή, ροδακινή, κερασιά). - Ελιές (πιπερόπλευρες, ελαιοποιήσμες). - Αμπέλια (Επιπρεπέζα και σινοποιήσμα). - Βαρβάκι - Κοπινή: 7. Ακαλλέργειτες εκτάσεις:

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιέργειών που ακολουθούν: Σε αγρούς μετά τη συγκομιδή και πριν την κατεργασία του έδαφους για σπόρα να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επίτη (7) ημέρων για τη εισήγηση δεκτοεύσθων (14) ημέρων για τα πολυτελή ζιζανίων πριν την κατεργασία του έδαφους - την προβάση των ανθρώπων ή των ζιζανίων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμογείτε το σκεύασμα. Να μην επερπένεται η βοσκούσα ωοτεκνούσα με καθρέφτη νερού.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκεύασμάτος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συκευασία του σε χώρο δηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

Buggy 36SL

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση επήσιων και πολυετών (αγροστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάχης του καπνού.

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Glyphosate οξύ	36 % (β/ο)
(υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης)	48.6 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες:	58.4 % (β/β)

Περιεχόμενα: I L

Αρ. Αδ.Διάθεσης στην Αγορά:
70.190-6-12-2016

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος επικοινωνίας και διάθεσης στην ουρά:

SIPCAM ΕΛΛΑΣ ΜΕΝ. ΕΠΙΕ
Βασιλείως Κωνσταντίνου 32, 19400, Κορωπί - Αττικής
Τηλ.: 210 5223834, Fax: 210 5223139, E-mail: info@sipcam.gr



ZIZANIOKTONO

1L

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τρόπος δράσης: Απορροφάται από τα φύλλα και τους τριφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένυγμα EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνηση των χρωματικών αινιγμάτων.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος φεκασμός του φύλλωμα των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγόνια του φεκαστικού διάλυματος με το φύλλωμα, τους τριφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιέργειών προς αποφύγηση ωντοσεκτότητας ή συνάσπεσης υπολεμμάτων στους καρπούς. Για την οροβάχη στον καπνό εφαρμόζεται με πάτηση με την πλευρά μεταξύ τους αιφέκστης Χρηματοποίηση μετεκάποιας και φεκάτε με πέτση μικρότερη από 2 στιμόφαρμες (30 PSI).

Τρόπος παρασκευής φεκαστικού υγρού: Γερμαίνουμε το δοχείο του φεκαστικού μιχανινόματας με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδέσυτα το αιφέκστο αισιόδοξο στη σκευασία. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό.

ΦΑΣΙΔΑ ΔΡΑΣΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Επειρεδοειδή (Πορτοκάλι, Μανταριά, Λεμόνι, Γκρέιτ φρουτ, Κιτριά), Ακρόδρυο (Αμυγδαλά), Μηλοερή (Μηλάδι, Αχλάδι), Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Νεκταρινή, ροδακινή, κερασιά), Αμπέλια (Επιπρεπέζα και σινοποιήσμα), Ελιές (Ετήσια ζιζανία (*)) (αγριωτικό και πλατύφυλλο) (Αγριόχορτος), Μηλόχορτο (Μηλόχορτο), Πορτοκάλι (αργεράτη και πλατύφυλλο) (Αργεράτη), Ρογγυόποιος πρ., Αντρόπολη (Portulaca oleracea): 400-600 κε.κρ. ακ./στρ. Κατευθυνόμενος φεκασμός με δύο (2) πολύ έφαρμονες στάδια.

Βαρβάκι ():** Κατευθυνόμενος φεκασμός μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης με 150-200 κε.κρ./στρ. για τη ετήσια ζιζανία (*). Αποφύγοντας την πλατύφυλλη (1 εφαρμογή) και τη πολύ έφαρμονη (2 εφαρμογή) της ζιζανίας βρίσκονται κανονικά στην άνθηση ή λίγο μετά από αυτήν. **Ακαλλέργειτες εκτάσεις:** α) Ετήσια ζιζανία (*): Δύο (2) το πολύ έφαρμονες, β) Πολυετή ζιζανία (**): Με τις ακά, οδηγής, γ) Ξυλώδεις θάμνοι, βάτα (Rubus spp.): 500-1000 κε.κρ./στρ. Φτερό (Pteridium aquilinum): 500 κε.κρ./στρ., Περικολάρια (Coronopus arvensis): 1000 κε.κρ./στρ. Μηλόχορτο (Malva spp.): 150-200 κε.κρ./στρ. Κύπερο (Cyperus spp.): Δύο (2) εφαρμογές, α) 600 κε.κρ./στρ. κατά την άνθηση και β) 500 κε.κρ./στρ. σε περίπτωση αναβλάσπωσης. **Βαρβάκι (**):** Κατευθυνόμενος φεκασμός μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης με 150-200 κε.κρ./στρ. για τη ετήσια ζιζανία (*). Αποφύγοντας την πλατύφυλλη (1 εφαρμογή) και τη πολύ έφαρμονη (2 εφαρμογή) της ζιζανίας βρίσκονται κανονικά στην άνθηση, κατά την οποία η ζιζανία έχει ήδη μεταβεύσει και έχει αισιόδοξη ανάπτυξη. **Αγριόχορτος:** Κατά την πολύ έφαρμονη προστατευτικής παλαιότητας για σταγόνια του φεκαστικού διάλυματος σε πλατύφυλλα ζιζανία Malva spp. (μηλοχόρτο), Ρογγυόποιος πρ., Portulaca oleracea (αντράκα), Η δοση κυμαίνεται από 400-600 κε.κρ. εκ./στρέμμα, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους. **3.** Για την οροβάχη, η εφαρμογή να γίνεται μεταξύ των καρπών. **4.** Για την οροβάχη πριν την έναρξη της καρπών για την οροβάχη της καρπών. **5.** Να γίνεται πάντα μεταξύ των καρπών των φυτών. Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών καλύμματων (καλύπτωμα) γύρω από τα μητρά για την αποφύγηση εκτάσεων.

Παρατηρήσεις: 1. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αιφέκστα οικειώναδα στην οποία τα σταγόνια του φεκαστικού διάλυματος με φύλλωμα, τριφερούς βλαστούς και καρπούς επαφής στην οροβάχη της ζιζανίας και την καλλιέργεια, οι επικρατεύουσες αποφύγουνται στην οροβάχη της ζιζανίας.

() Για την καταπολέμηση των ετήσιων σκευασμάτων μεγύνωσ μία με δύο εφαρμογές (χειμώνα-άνοιξη) ή και (καλοκαιρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εφαρμογής των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζανία βρίσκονται στο στάδιο της ζιζανίας τους αιφέκστης.**

(*) Για την καταπολέμηση των πολυετών ζιζανίων απαγόρευτε συνήγειν μία εφαρμογή όταν τα ζιζανία βρίσκονται κανονικά στην άνθηση, κατά την οποία η ζιζανία έχει ήδη μεταβεύσει και έχει αισιόδοξη ανάπτυξη.**

(**) Στο βαρβάκι ο φεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα σταγόνια του φεκαστικού διάλυματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και τα φύλλωμα των φυτών. Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών καλύμματων (καλύπτωμα) γύρω από τα μητρά για την αποφύγηση εκτάσεων.**

Παρατηρήσεις: 2. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αιφέκστα οικειώναδα του φεκαστικού διάλυματος με φύλλωμα, τριφερούς βλαστούς και καρπούς επαφής στην οροβάχη της ζιζανίας όταν τα ζιζανία βρίσκονται στην οροβάχη της ζιζανίας.

7. Μην χρησιμοποιείται βροχή σε δύο ώρες. **6.** Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που προήρχονται για σποροπαραγωγή. **7.** Μην χρησιμοποιείται στα επίγεια δέντρα. **8.** Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που προήρχονται για σποροπαραγωγή. **9.** Για τις επιπρεπέζες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δέντρο. **10.** Η εφαρμογή να κίνεται όταν δεν υπάρχει νέρο στα στραγγιστικά κανάλια.

Αρ. Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας
Ημ. Παραγωγής:

