

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφρονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανισθεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτο το δοχείο ή την ετικέτα. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210779377

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμού/ εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γάντια και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό».

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Για να προστατέψετε τους υδροβίους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αφέαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ



Αρ. Παρτίδας
Ημ. Παρασκευής

Βλέπε φιάλη

Turbine

Pendimethalin (πεντιμεθαλίν)
Εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Pendimethalin: 36,5% β/ο (40,55% β/β)
βοηθητικές ουσίες: 64,02% β/β



Τοξικό για τους υδροβίους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ερυθρήτητα δέρματος ή σκάμιο.

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.

Περιεχόμενο: 1 lt.
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ:
Αρ.Πρωτ. ΥΑΑΤ:
13185/130059/13-3-2013

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον.ΕΠΙΕ
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, Κορωπί 19400,
Τηλ.: 210 5223834, e-mail: info@sipcam.gr

SIPCAM



ZIZANIOKTONO

1L
ΠΡΟΪΟΡΙΖΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ
ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΠΑΙΔΙΑ**

GR01/12-2016/2

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Στο βιοχημικό επίπεδο επηρεάζει τη λειτουργία της μίτωσης με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροσωληνίσκων της μιτωτικής σπείρας.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά): Δόση 250-300 κ.ε.κ.κ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης την άνοιξη ή το φθινόπωρο χωρίς να βρέγονται τα πράσινα μέρη των δένδρων. **Ακρόδρυα** (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά): Δόση 250-300 κ.ε.κ.κ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης). **Μηλοειδή** (Μηλιά, Αχλαδιά): Δόση 250-300 κ.ε.κ.κ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης). **Πυρηνόκαρπα** (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά): Δόση 250-300 κ.ε.κ.κ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης). **Αμύγδα**: Δόση 250-300 κ.ε.κ.κ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης, το χειμώνα (κατά το λήθαργο, πριν την έναρξη της βλάστησης). **Καρφό**: Δόση 200-250 κ.ε.κ.κ./στρ. Προφυτρικά της καλλιέργειας. **Κρεμμύδι, Σκόρδο**: Δόση 100-250 κ.ε.κ.κ./στρ. Προφυτρικά ή μεταφυτρικά της καλλιέργειας (στο στάδιο των 2-3 φύλλων). **Τομάτα, Πιπεριά**: Δόση 125-220 κ.ε.κ.κ./στρ. Πριν τη μεταφύτευση. **Μαρούλι**: Δόση 150-200 κ.ε.κ.κ./στρ. Πριν τη μεταφύτευση. **Αρακάς**: Δόση 170-250 κ.ε.κ.κ./στρ. Προφυτρικά της καλλιέργειας. **Φασολιά νωπά**: Δόση 170-250 κ.ε.κ.κ./στρ. Προφυτρικά της καλλιέργειας. **Όσπρια** (Φασόλι): Δόση 170-250 κ.ε.κ.κ./στρ. Προφυτρικά της καλλιέργειας. **Ηλιανθος**: Δόση 200-300 κ.ε.κ.κ./στρ. Προφυτρικά της καλλιέργειας. **Σόγια**: Δόση 200-250 κ.ε.κ.κ./στρ. Προφυτρικά της καλλιέργειας. **Βαμβάκι**: Δόση 200-300 κ.ε.κ.κ./στρ. Προφυτρικά με ενσωμάτωση ή προφυτρικά της καλλιέργειας. **Πατάτα**: Δόση 170-300 κ.ε.κ.κ./στρ. Προφυτρικά της καλλιέργειας. **Σπύρι**: Δόση 170-300 κ.ε.κ.κ./στρ. Προφυτρικά της καλλιέργειας. **Αραβόσιτος**: Δόση 200-300 κ.ε.κ.κ./στρ. Προφυτρικά της καλλιέργειας. **Καννός**: Δόση 125-300 κ.ε.κ.κ./στρ. Πριν τη μεταφύτευση. **Καλλωπιστικά**: Δόση 250-300 κ.ε.κ.κ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης μετά τη μεταφύτευση, σε καλά εγκατεστημένες φυτείες.

Στόχος: Για όλες τις καλλιέργειες του πεδίου εφαρμογής ο στόχος είναι: **Ετήσια ζιζάνια*** (αγρωστώδη και πλατύφυλλα).

Όγκος ψεκαστικού δ/τος: Για όλες τις καλλιέργειες του πεδίου εφαρμογής ο όγκος του ψεκαστικού δ/τος είναι: 20-40 λίτρα / στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο: Για όλες τις καλλιέργειες του πεδίου εφαρμογής ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο είναι: 1

* **Ευαίσθητα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:** *Alopecurus myosuroides* (αλεπουσουρά), *Digitaria sanguinalis* (αιματόχορτο), *Echinochloa crus-galli* (μουχρίτσα), *Panicum dichotomiflorum* (πάνικο διχοτομικό), *Setaria viridis* (σετάρια πράσινη), *Setaria verticillata* (σετάρια σποινδυλωτή), *Poa annua* (κοινή πέα).

* **Ευαίσθητα ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια:** *Amaranthus retroflexus* (τραχύ βλάτο), *Amaranthus biolitus* (πλαγιαστό βλάτο), *Anagallis anvensis* (αναγάλλια), *Capsella bursa-pastoris* (καϊφέλλα), *Cardamine hirsuta* (καρδαμίνια), *Chenopodium album* (λουβουδιά), *Euphorbia* spp. (γολατισίδες), *Polygonum persicaria* (αγριοπιπεριά), *Polygonum aviculare* (πολυκόμμι), *Polygonum lapathifolium* (λαπάτσα), *Bilderdýkia conovalvulus* (αναρχώζιμο πολυγόνο), *Portulaca oleracea* (αντράκλα), *Solanum nigrum* (αγριοτοματά ή στέφνιο), *Sonchus oleraceus* (λωτός), *Stachys annua* (στάχυς), *Stellaria media* (στελλάρια), *Urtica urens* (μικρή τσουκνίδα), *Veronica hederifolia*, *Veronica persica* (βερνίκια), *Viola anvensis* (κοινός αγριοτσινίδας).

Turbine

Παρατηρήσεις: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος TURBINE. Προετοιμάστε καλή απορροκλήνη, επίθεση, ψυχωματισμένη και αρκετά σμυγιά. Πιστώστε εάν δεν βρέξει μέσα σε 7-10 ημέρες από την εφαρμογή ώστε να ενσωματωθεί το φάρμακο στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους. Σπείρετε τις καλλιέργειες σε ομοιόμορφο βάθος σποράς τουλάχιστον 3 εκ. για τα καρότα και τα κρεμμύδια και 4 εκ. για τις υπόλοιπες καλλιέργειες, έτσι ώστε να μην ξεσκαπάζονται ή μένουν σπόροι στην επιφάνεια. Στις μεταφυτευμένες καλλιέργειες (τομάτα, πιπεριά και καπνό) εφαρμόστε το TURBINE σε καλά ψυχωματισμένο έδαφος τουλάχιστον 7-8 ημέρες πριν την μεταφύτευση. Ενσωματώστε με ελαφρύ πότισμα το οποίο πρέπει να επαναληφθεί μετά την μεταφύτευση. Σε καμία περίπτωση μη κάνετε "γέμισμα" (τράβηγμα χύματος στην ρίζα) πριν περάσουν τουλάχιστον 30 ημέρες από την εφαρμογή. Στις μεταφυτευτικές εφαρμογές τα ζιζάνια θα πρέπει να είναι σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμα-κοτυλήδονες). Μετά την εφαρμογή, πλύνετε καλά το ψεκαστικό και όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Σε περίπτωση που επιβάλλεται επανασπορά σε ψεκασμένο έδαφος, αποφεύγετε την επαφή του νέου σπόρου με το φάρμακο, σπέρνοντας σε μεγαλύτερο βάθος χωρίς την μετακίνηση του επιφανειακού εδάφους ή οργώνοντας σε βάθος τουλάχιστον 20 εκ. το οποίο είναι απαραίτητο εάν η αρχική καλλιέργεια αντικατασταθεί με ζαχαρότευτλο. Οι μικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδαφή - χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και μικρούς πληθυσμούς ζιζανίων, ενώ οι μεγαλύτερες σε μέσης σύστασης ή βαριά εδαφή - μέσης έως υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή/και μεγαλύτερους πληθυσμούς ζιζανίων. Προτεινόμενα είδη καλλωπιστικών φυτών: Τούγια (*Thuja occidentalis*), είδη *Prunus* sp., Κουπροσκόπις (*Cyproscoparis leylandii*), Βιβούρνο (*Viburnum* sp.), Κράταιγος (*Crataegus* sp.), Ήμερο ποικυράρι (*Ilex* sp.), Πασχαλιά (*Syringa vulgaris*), Μανόλια (*Magnolia grandiflora*), Δρυς (*Quercus* sp.), Φοινίκας (*Phoenix* sp.), Πεύκο (*Pinus* sp.), Λεύκα

(*Populus alba*), Πλάτανος (*Platanus occidentalis*), Ιτιά κλαίουσα (*Salix babylonica*), Καρυδιά (*Juglans nigra*), Ροδόδεντρο (*Rhododendron* sp.), Πυξός (*Buxus* sp.), Καμέλια (*Camelia japonica*), Γαρδένια (*Gardenia jasminoides*), Κυδωνίααστρο (*Cotoneaster* sp.), Κυπαρίσις (*Cupressus sempervirens*), Ευώνυμο (*Euonymus japonicus*), Πυράκανθα (*Pyracantha coccinea*), Φορούθια (*Forsythia intermedia*), Ίβισκος (*Hibiscus syriacus*), Άρκευθος (*Juniperus* sp.), Λεβάντα (*Lavandula angustifolia*), Αγγελική (*Pittosporum tobira*), Μυρτιά (*Myrtus communis*), Πικροδάφνη (*Nerium oleander*), Χαμαίροπος (*Chamaerops* sp.), Φωτίνια (*Photinia* sp.), Λιγούστρο (*Ligustrum* sp.), Δάφνη Απλόκλωνος (*Laurus nobilis*), Γιούκα (*Yucca* sp.), Κισσός (*Hedera helix*), Πελαργόνιο (*Pelargonium* sp.), Γιασεμί (*Jasminum* sp.), Μυόπορο (*Myrororum parviflorum*), Σπαράγγι (*Asparagus officinalis*), Φρέζια (*Freesia* sp.), Λίλιουμ (*Lilium* sp.), Παϊώνια (*Paeonia* sp.), Γλυτσίνια (*Wisteria* sp.), Αμπροφίλα sp.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής φυτογείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευμένης καλλιέργειας: 1) Σόγια, βαμβάκι, μπέλιξ, σκόρδο, ηλιανθος και μεταφυτευόμενες καλλιέργειες μπορούν να σπαρθούν/φυτευτούν οποτεδήποτε μετά την εφαρμογή του TURBINE, αφού προηγηθεί βαθιά άροση (15-20 εκ.). 2) Πατάτα μπορεί να φυτευτεί 3 μήνες μετά την εφαρμογή του TURBINE αφού προηγηθεί βαθιά άροση (15-20 εκ.).

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: 1) Άλλες καλλιέργειες μπορούν να σπαρθούν/φυτευτούν 6 μήνες μετά την εφαρμογή του TURBINE αφού προηγηθεί βαθιά άροση (15-20 εκ.). 2) Ζαχαρότευτλα μπορούν να σπαρθούν 10 μήνες μετά την εφαρμογή του TURBINE αφού προηγηθεί βαθιά άροση (15-20 εκ.).

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευσαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Το προϊόν είναι αποτελεσματικό και καταπολεμά τα ζιζάνια που φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμα - κοτυλήδονες). Εφόσον υπάρχουν φυτρώνοντα ζιζάνια θα πρέπει προηγουμένως να καταστραφούν με σκάλισμα ή βοτάνισμα ή με κατάλληλο μεταφυτευτικό ζιζανιοκτόνο. Η εκλεκτικότητα ως προς τις παραπάνω καλλιέργειες που σπέρνονται εξαρτάται άμεσα από την τήρηση των οδηγιών του χρόνου και του βάθους σποράς. Σε περίπτωση ανομοιομόρφης σποράς σε πολύ μικρό βάθος, η εκλεκτικότητα μπορεί να είναι περιορισμένη, ειδικά εάν ακολουθήσουν ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την εφαρμογή. Οι μεταφυτευτικές εφαρμογές, πρέπει να γίνονται 7-8 ημέρες πριν την εγκατάσταση των φυτών, στα οποία δεν πρέπει να γίνει γέμισμα (τράβηγμα χύματος στην ρίζα) πριν περάσει ένας μήνας. Στα κρεμμύδια, καρότα, καλαμπόκι και ηλιανθο, χρησιμοποιήστε τις μικρότερες δόσεις στα ελαφρά εδαφή. Κατά τις εφαρμογές σε καλλωπιστικά φυτά, το σκεύασμα να μην έρχεται σε επαφή με το φύλλωμα ή τα μη καλά ξυλοποιημένα μέρη των φυτών. Το σκεύασμα μπορεί να είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που δεν αναφέρονται σε αυτή την επικείτα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Δεν ορίζεται λόγω πολύ ενωρίς χρόνου εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φίλες ξεπλύνονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται tripλό ξέπλυμα (τα νερά το ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη προαγόμενης χρήσης, ενσωματώνονται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: –

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός εδάφους προφυτευτικά ή μεταφυτευτικά. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και δόσεις εφαρμογής. Το προϊόν είναι αποτελεσματικό και καταπολεμά τα ζιζάνια που φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμα - κοτυλήδονες). Εφόσον υπάρχουν φυτρώνοντα ζιζάνια θα πρέπει προηγουμένως να καταστραφούν με σκάλισμα ή βοτάνισμα ή με κατάλληλο μεταφυτευτικό ζιζανιοκτόνο. Η εκλεκτικότητα ως προς τις παραπάνω καλλιέργειες που σπέρνονται εξαρτάται άμεσα από την τήρηση των οδηγιών του χρόνου και του βάθους σποράς. Σε περίπτωση ανομοιομόρφης σποράς σε πολύ μικρό βάθος, η εκλεκτικότητα μπορεί να είναι περιορισμένη, ειδικά εάν ακολουθήσουν ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την εφαρμογή. Οι μεταφυτευτικές εφαρμογές, πρέπει να γίνονται 7-8 ημέρες πριν την εγκατάσταση των φυτών, στα οποία δεν πρέπει να γίνει γέμισμα (τράβηγμα χύματος στην ρίζα) πριν περάσει ένας μήνας. Στα κρεμμύδια, καρότα, καλαμπόκι και ηλιανθο, χρησιμοποιήστε τις μικρότερες δόσεις στα ελαφρά εδαφή. Κατά τις εφαρμογές σε καλλωπιστικά φυτά, το σκεύασμα να μην έρχεται σε επαφή με το φύλλωμα ή τα μη καλά ξυλοποιημένα μέρη των φυτών. Το σκεύασμα μπορεί να είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που δεν αναφέρονται σε αυτή την επικείτα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο με ψεκαστικό μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδενώντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδενώντας συνεχώς.

Παρατηρήσεις: Το TURBINE είναι ασφαλές κατά την εφαρμογή του γύρω και κάτω από πολλά είδη καλλωπιστικών (φυτά, θάμνοι, δέντρα). Ωστόσο δεν έχει διερευνηθεί η εκλεκτικότητα του σε όλες τις ποικιλίες και τα υβρίδια. Ανεπιθύμητες επιπτώσεις, όπως η φυτοτοξικότητα, μπορεί να προκύψει εξαιτίας διαφόρων περιβαλλοντικών συνθηκών, συνθηκών ανάπτυξης ή από τον τρόπο εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου. Επομένως, συστήνεται, πριν τη γενικευμένη χρήση του, η δοκιμή σε ένα μικρό αριθμό φυτών ή η εξέτασή τους 1-2 μήνες μετά για πιθανή φυτοτοξικότητα. Μην κάνετε καθολικούς ψεκασμούς σε φυτώρια ή σε φυτά προς μεταφύτευση. Μην εφαρμόζετε το TURBINE σε καλλωπιστικά φυτά που έχουν εμβολαστεί ή είναι σε έντονη βλαστηπική ανάπτυξη ή κατά την ανθοφορία. Μην εφαρμόζετε το TURBINE σε φυτά κατά την έναρξη της ανθοφορίας ή την πρώτη βλαστηπική ανάπτυξη. Μην επιτρέψετε τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού να πέσουν πάνω στο φύλλωμα, τους οφθαλμούς ή τα άνθη. Προσπίστε ώστε το έδαφος να μην έχει σκαμιάται ή ρωγμές που ενδεχομένως θα επιτρέψουν την επαφή του TURBINE με το ριζικό σύστημα των καλλωπιστικών φυτών. Όταν το ριζικό σύστημα έχει εγκατασταθεί καλά, κάνετε την εφαρμογή του TURBINE πριν τον εμβολιασμό ή την άνθιση των φυτών. Σε περίπτωση που κάποια είδη καλλωπιστικών παρουσιάζουν φυτοτοξικότητα, μην τα φυτέψετε σε έδαφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί TURBINE κατά την προηγούμενη καλλιέργητική περίοδο. Για φυτά που μεταφυτεύονται γυμνόριζα, μην εφαρμόζετε το TURBINE πριν περάσουν 2-4 εβδομάδες από τη μεταφύτευση στην οριστική τους θέση.