


Ο επαναστατικός συνδυασμός δύο πρωτότυπων προϊόντων, **zippy_{GEO} 0,4G** και **Umostart**, δίνει εξαιρετικά υψηλή αποτελεσματικότητα και γρήγορο ξεκίνημα των φυτών.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Lambda cyhalothrin (0.4%):

Εκτεταμένες μελέτες της **SIPCAM** έχουν δείξει ότι η συμπεριφορά του Lambda έχει ισχυρή εμμονή στο έδαφος και υψηλή αποτελεσματικότητα, σε συνδυασμό με απωθητική δράση σε χαμηλές δόσεις.



7% N

35% P₂O₅


**ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΧΟΥΜΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ**

ΜΙΚΡΟΚΟΚΚΟΣ "STARTER"

Οι μικροκόκκοι, δημιουργία της **AGROQUALITÀ**, με βάση οργανοχουμικό άζωτο και φώσφορο (NP 7.35) δίνουν άμεσα αφομοιώσιμα θρεπτικά στοιχεία και έχουν επίδραση starter στα πρώτα, ευαίσθητα στάδια ανάπτυξης των φυτών.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΚΟΥΛΗΚΑ

Με το **TRIKA EXPERT** εξασφαλίζετε υψηλά επίπεδα προστασίας των καλλιεργειών από σιδηροσκουλήκα.



Μέσος όρος αποτελεσματικότητας 10 πειραμάτων αγρού (2012 - 2013)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΔΑ / ΚΑΡΑΦΑΤΜΕ




ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- ✓ Υψηλή συγκέντρωση άμεσα αφομοιώσιμου φωσφόρου.
- ✓ Άζωτο οργανοχουμικής προέλευσης με σταδιακό ρυθμό απελευθέρωσης.
- ✓ Πρόσθετα με "ριζογόνο" δράση.
- ✓ Σε επαφή με το σπόρο. Η άμεση διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στο υδατικό διάλυμα εξασφαλίζει γρήγορη ανάπτυξη της ρίζας ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες (ψύχος, υγρασία, ξηρασία).
- ✓ Τα συμπαγή και ομοιόμορφα μικροσφαιρίδια επιτυγχάνουν σταθερή και βαθμιαία απελευθέρωση των θρεπτικών στοιχείων ώστε να μην προκύπτει φυτοτοξικότητα.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΓΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ!

Τα φυτά αναπτύσσονται γρηγορότερα και διαμορφώνουν πλούσια φυλλική επιφάνεια ώστε να επωφεληθούν περισσότερο από την ηλιακή ακτινοβολία του Ιουνίου - Ιουλίου



Προσαρμογή από «Evoluzione e innovazione della tecnica culturale del mais»
- prof. Reyneri - (Univ. Torino)

Ενέργεια & Προστασία

TRIKA[®] expert

ΕΚΔΟΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Φάσμα Δράσης

Καλλιέργειες: Βαμβάκι, Καλαμπόκι, Πατάτα, Τομάτα, Μελιτζάνα, Σόργο, Κεχρί.

Καταπολεμούμενα έντομα: Αγρότιδες (*Agrotis spp.*)
(Κοφτοσκούληκα, Καραφατμέ) Σιδηροσκούληκα (*Agriotes spp.*)

Δόση: 1-1,5 κιλά/στρ.

Για την **Διαβρώτικα** στο καλαμπόκι, στα 5-9 φύλλα, διασκορπισμός 1,2-1,5 κιλά/στρ. κατά το αυλάκωμα.

Τρόπος εφαρμογής
Ομοιόμορφος διασκορπισμός κατά τη σπορά ή φύτευση στο βάθος σποράς / φύτευσης κατά μήκος της γραμμής.

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14486/23-07-14

Κάτοχος της άδειας:

OXON ITALIA, S.p.A.

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

 **SIPCAM**
HELLAS

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον.ΕΠΕ

Βασ. Κωνσταντίνου 32, Κορωπί 19400

Τηλ.: 210 5223 834

e-mail: info@sipcam.gr • www.sipcam.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο φυλλάδιο έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας οδηγίες χρήσης.

 **SIPCAM**
HELLAS

www.sipcam.gr