

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην τρώτε πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με μεγάλης ποσότητας νερού για 15 λεπτά κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Να αποφευχθεί παρατεταμένη ή συχνά επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα διότι μπορεί να προκληθεί ερεθισμός. Εάν το προϊόν πέσει με μεγάλη πίεση στο δέρμα, μπορεί να εισαχθεί μέσα στους ιστούς. Στη περίπτωση αυτή να ζητηθεί ιατρική εξέταση ακόμη και αν δεν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Ο παθών να μεταφερθεί σε καθαρό αέρα. Κρατείστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Μπορεί να προκληθεί ερεθισμός του στόματος και της αναπνευστικής οδού.

Αντιδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος με ψεκασθήρες κοινού όγκου (5-6 atm) ή μηχανοκίνητους (25-30atm) και μπέκ τύπου σκούπας σε:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: (Λεμονιά, πορτοκαλιά, νεραντζιά): - Κοκκοειδή: Κόκκινη Ψώρα, Ψευδοκόκκος, Λεκάριο, Άσπρη ψώρα, Μυτιλόμορφη ψώρα, Παρλατόρια, -Αφίδες, -Ακάρεα, -Προνύμφες εντόμων.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: (Μηλιά, Αχλαδιά), -Κοκκοειδή: Βαμβακίδα, Μυτιλόμορφη ψώρα, Μαύρη Ψώρα, Σφαίρολεκάριο, -Αυγά ακάρεων, -Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: (Βερκοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, δαμασκηνιά): -Κοκκοειδή: Βαμβακάδα, Σφαίρολεκάριο, Μυτιλόμορφη ψώρα, -Αυγά ακάρεων, -Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων.

ΕΛΙΑ: -Κοκκοειδή: -Λεκάριο, Ασπιδιώτης, Παρλατόρια, Πολίνα, Προνύμφες εντόμων. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ:** -Κοκκοειδή: Παρλατόρια, Μυτιλόμορφη ψώρα, -Αυγά τετρανύχων, Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων.

Πεύκα αστικών περιοχών και περαστικών περιοχών: *Marchalina hellenica*.

Εποχή εφαρμογής: Α.Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά, Καλλωπιστικά: Μπορεί να εφαρμοστεί καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συστατώντας ψεκασμό:

-Ανοιξής (με την έναρξη της βλάστησης),-Καλοκαίρι,-Φθινοπώρο,-Χειμώνα. Για τα εσπεριδοειδή η καλύτερη εποχή είναι αρχές Ιουνίου με τέλος Σεπτεμβρίου.

Σε περίπτωση έντονης προσβολής μπορεί να γίνει ψεκασμός και τον χειμώνα (Φεβρουάριο - Μάρτιο).

Δοσολογία: 1000 - 1300 κ.εκ. στα 100 λίτρα ψεκ. υγρού όταν εφαρμόζεται μόνο του ή 500 κ.εκ. σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα /στρέμμα): Εσπεριδοειδή 200-400, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα:150-250, Ελιά 150-30, Καλλωπιστικά 80.

Μείγνους αραιών ψεκασμού ανά καλλιεργητική περίοδο:4

Β.Πεύκα: Όταν έχει εκκολληθεί το 70-75% των νυμφών (ερπουσών) και όταν τα πεύκα δεν έχουν μελιτώδη εκκρίματα και δεν παρατηρείται δραστηριοποίηση μελισσών,εφαρμόγη 1,3 λίτρα σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Μείγνους αραιός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1 (Για τον ίδιο σκοπό δεν θα χρησιμοποιηθεί και άλλο φυτοπροστατευτικό σκευάσμα).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: -Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση - Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ομοιομόρφο γαλάκτωμα και να ριχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. -Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. - Σε περίπτωση που πρέπει να προστεθούν άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό γίνεται αφού πρώτα το γαλάκτωμα του ορυκτέλαιου αναδειθεί καλά. - Σε περίπτωση που το αναμειγνύουμε με βρέξιμη σκόνη, ετοιμάζουμε πρώτα το αραιωμένο γαλάκτωμα ορυκτέλαιου και μετά προσθέτουμε την ήδη διαλυμένη σε νερό βρέξιμη σκόνη.

Treenol® EC

Παραφινικό ορυκτέλαιο
Υγρό Γαλακτωματοποίησης (EC)

Εγγυημένη Σύνθεση: paraffin mineral oil 96.3% β/β (79.25% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 3.7% β/β

Θερινός πολτός, κατά κοκκοειδών, ακάρεων, αφίδων και λεπιδοπτέρων

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αναπτ. & Τροφ.: 1885/25-10-2000

Κάτοχος έγκρισης - Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ
Βασ. Κωνσταντίνου 32, Κορωπί 194 00, Τηλ. 210 522 3834

Παρασκευαστής σκευάσματος: SIPCAM SpA., Ιταλία



SIPCAM

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.
 2. Κατά τη χρήση του **TREENOL EC** τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
 3. Αποφεύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα και σε περιόδους έντονης ξηρασίας.
 4. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
 5. Να μην γίνεται ψεκασμοί όταν υπάρχει παγετός ή κίνδυνος παγετού, καθώς και σε περιόδους ξηρασίας και υπερβολικής υγρασίας.
 6. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασουλφίου.
 7. Στα μηλοειδή και ειδικά στο κρυστάλλι να μην προηγηθεί ή έπεται εφαρμογή captan, folpet, δινιτροσεούσεων, σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.
- Παρατηρήσεις για την εφαρμογή στα πεύκα:**
1. Ο ακριβής χρόνος επέμβασης, θα προσδιορίζεται από τους Γεωπόνους των Δήμων και Κοινοτήτων ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή άλλη Κρατικής Υπηρεσίας.
 2. Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός με καλά διαβροχή, των προσβεβλημένων από το *Marchalina hellenica* μερών των πεύκων. **Η εφαρμογή του σκευάσματος θα γίνεται παρουσία Γεωπόνου.**
 3. Απαγορεύσεις: - Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε δασικά οικοσυστήματα.
 - Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε πεύκα που έχουν μελιτώδη εκκρίματα και όταν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών.
 - Περιορισμοί - προφυλάξεις:

- Πριν από την εφαρμογή του σκευάσματος σε κοινόχρηστο χώρο, οι Δήμοι υποχρεούνται να προειδοποιούν τους κατοίκους για τον επικείμενο ψεκασμό.
- Οι Δήμοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την επισημάωση των περιοχών όπου έγινε εφαρμογή.
- Κατά την διάρκεια της εφαρμογής του σκευάσματος (τόσο σε κοινόχρηστο όσο και σε ιδιωτικούς χώρους) και έως ότου στεγνώσουν τα ψεκασθέντα μέρη των πεύκων, να μην εισέρχονται άνθρωποι (πλην του ψεκαστή) και κατοικίδια ζώα στην ψεκασμένη περιοχή.
- Σε κοινόχρηστο χώρο (πάρκα, σχολεία) απαιτείται διάστημα 24 ωρών για την είσοδο των ανθρώπων.
- Η χρήση του σκευάσματος για την αντιμετώπιση του εντόμου *Marchalina hellenica* σε πεύκα αστικών και περιαστικών περιοχών, θα πραγματοποιείται:
- a) Σε κοινόχρηστο χώρο, με ευθύνη των κατά τόπους Δήμων και Κοινοτήτων, οι οποίοι: - Θα καθορίσουν την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής του σκευάσματος.
- Θα λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης για την ασφαλή χρήση του.
- β) Σε ιδιωτικούς χώρους (αυλές σπιτιών, οικόπεδα κλπ), με ευθύνη των ενδιαφερομένων. Η εφαρμογή θα διενεργείται τον χρόνο που γίνεται εφαρμογή στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω χώρων, να συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των Δήμων που επιβλέπουν την εφαρμογή του σκευάσματος στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής, και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.

Τελευταία επέμβαση πριν την ανοικτομή: 21 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες. Σε περίπτωση αναμείξεως με άλλο σκεύασμα σφειλώμενο να τηρούμε την "τελευταία επέμβαση" του άλλου σκευάσματος (αν αυτή είναι πάντα από 21 ημέρες).

Φυτοτοξικότητα: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάμενες δόσεις και οδηγίες χρήσης. Να χρησιμοποιούνται οι μικρές δόσεις σε ευαίσθητα στο λάδι φυτά (π.χ. σε μερικά καλλωπιστικά). Να γίνεται δοκιμή σε 1-2 φυτά.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα, θείο, Captan.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλύνονται από πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τρίπλο έξιπλυμα (τα νερά του έξιπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αναποστρέφονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείται στην αρχική του παραβλήσιμη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και κατά αεριζόμενο περιβάλλον. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερ. Παραγωγής: Βλέπε επί της συσκευασίας
Αριθμός Παρτίδας:



SIPCAM