



SIPCAM INAGRA 50 WP
Phosmet

Phosmet

SIPCAM INAGRA 50 WP

ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΜΑΣΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΥΖΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ
Βρέξιμη σκόνη (WP)

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Phosmet (φωσμέτ)	50 % (β/β)
Βοηθητικές ουσίες	47.37 % (β/β)

Περιεχόμενο: 600 gr
Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14526/30-6-2015

Κάτοχος της άδειας: SIPCAM INAGRA SA, Calle Prof. Beltran Banguena, 5, Valencia, Ισπανία
Υπεύθυνος επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά: ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ, Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, 19400 Κορωπί, Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139, E-mail: info@sipcam.gr

600gr



ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

XXXXXX

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
Εσπεριδοειδή (Γκρέιπ φρούτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά): Μύγα Μεσογείου (*Ceratitis capitata*). Δόση: 100 γρ./στρέμμα ή 50 γρ./100 λίτρα ψεκυγρού. Όγκος ψεκ υγρού: 200 λίτρα στρέμμα. Ψεκασιός με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο που οι καρποί έχουν το 90% του τελικού μεγέθους έως την ωρίμανση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 1.
Μηλιά, Αχλαδιά, Κιουδιά, Αχλαδομηλιά: Καρποκάφα (*Cydia pomonella*). Δόση: 150 γρ./στρέμμα ή 150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ υγρού: 100 λίτρα στρέμμα. Ψεκασιός με την εμφάνιση της προσβολής από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 2/20.
Ροδακινιά, Νεκταρινιά: Μύγα Μεσογείου (*Ceratitis capitata*) Καρποκάφα (*Cydia molesta*) Ανάσσια (*Anastasia lineatella*). Δόση: 150γρ./στρέμμα ή 150 γρ./100 λίτρα ψεκυγρού. Όγκος ψεκ υγρού: 100 λίτρα στρέμμα. Ψεκασιός με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο μικρών καρπών έως την αλλαγή χρώματος καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 2/10.
Ελιά: Πυρηνωτήτης (*Prays oleae*) Δάκος (*Dacus oleae*). Δόση: 150 γρ./στρέμμα ή 75 γρ./100 λίτρα ψεκυγρού. Όγκος ψεκ υγρού: 200 λίτρα στρέμμα. Ψεκασιός καλύψιος με την εμφάνιση της προσβολής από την ανθής έως την ωρίμανση των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 2/10.

Παρατήρησης:

1. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται προγράμματα γεωργικών προετοιμοτήσεων, να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προετοιμοτήσεων.
2. Στην ποικιλία της Καλαμών της ελιάς να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασιός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μείση με νερό. Αραιώστε τη συνιστάμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασιού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τον ψεκασιό είναι απαραίτητος ο ειδικαστικός καθαρισμός ψεκαστήρα. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βύτιο. Στεγνώστε το βύτιο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε δύο (2) φορές με καθαρό νερό. Ο τελικός καθαρισμός να γίνεται με διάλυμα οξόος ή απορρυπαντικό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγούμενως με ακίδιο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή του σκευάσματος με εντομοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης. Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να αποφεύγεται η επανεισόδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό (24 ώρες).

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελλη-νικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία <40 °C. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Εσπεριδοειδή (Γκρέιπ φρούτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά), Ροδακινιά, Νεκταρινιά: 14 ημέρες. **Μηλιά, Αχλαδιά, Κιουδιά, Αχλαδομηλιά:** 28 ημέρες. **Ελιά:** 21 ημέρες.

Phosmet

SIPCAM INAGRA 50 WP

ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΜΑΣΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΥΖΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ
Βρέξιμη σκόνη (WP)

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Phosmet (φωσμέτ)	50 % (β/β)
Βοηθητικές ουσίες	47.37 % (β/β)

Περιεχόμενο: 600 gr
Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14526/30-6-2015

Κάτοχος της άδειας: SIPCAM INAGRA SA, Calle Prof. Beltran Banguena, 5, Valencia, Ισπανία
Υπεύθυνος επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά: ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ, Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, 19400 Κορωπί, Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139, E-mail: info@sipcam.gr

600gr



ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



- Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην αναπνέετε σκόνη / σταγονίδια / εκνεφώματα. Πλύνετε τα χέρια αλογαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Φοράτε κατάλληλα γάντια και μέσο ατομικής προστασίας της αναπνοής κατά την ανάμιξη / φόρτωση και προστατευτική ολόσωμη φόρμα και ανθεκτικά υποδήματα κατά την εφαρμογή.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Αντίδοτο: Περιέχει phosmet, αναστολέα της γολινεστεράσης. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, χρησιμοποιήστε θεϊκό άλας ατροπίνης σε μεγάλες δόσεις, 2 έως 4 mg ενδοφλέβιως ή ενδομυϊκά το συντομότερο δυνατόν. Επαναλάβετε ανά 5 έως 10 λεπτά, έως ότου εμφανιστούν ενδείξεις ατροπινισμού και διατηρήσετε πλήρη ατροπινισμό μέχρι όπου μεταβολισθεί όλο το οργανοφωσφορικό. Συνιστάται η χορήγηση Obidoxime chloride (Τοξογονίη) εναλλακτικά με pralidoxime-2 chloride (2-Pam) ως προσθήκη, αλλά όχι σαν υποκατάστατο του θεϊκού αλάτος ατροπίνης. Η θεραπεία με oxime πρέπει να διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια χορήγησης θεϊκού αλάτος ατροπίνης.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

- Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν σφραγιστή ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 95%.
- Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μίαν σφραγιστή ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη καλλιεργούμενη γη.
- Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικίνδυνη μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Απομακρύνετε η και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.
- Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Ημερ. Παραγωγής:
Αριθμός Παρτίδας:

