

# ERIPHANY 15 SL

**Υδατοδιαλυτό υγρό (SL)**

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ**

Ethoxylated Isodecyl Alcohol: 15% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 85,98% β/β

**Προσκολλητικό. Για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ψεκαστικών διαλυμάτων ανάλογα με την ικανότητα διαβροχής της βλάστησης και την σκληρότητα του νερού.**



**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

**Παρασκευαστής-Διανομέας:** Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, Τ.Κ. 19400 Κορωπί - Αττικής  
Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139, E-mail: info@sipcam.gr



**SIPCAM**

**Περιεχόμενο: 1L**

**ΔΟΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** • Γενική δόση: 10-30cc/100 lt ψεκ. διαλύματος • Ψεκ. διαλύματα οργανικών μυκητοκτόνων, βρέξιμου θείου και εντομοκτόνων: 15-20 cc/100 lt • Ψεκ. διαλύματα χαλκούχων μυκητοκτόνων: 20-25 cc/100 lt • Ψεκ. διαλύματα διαφυλλικών λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων: 30 cc/100 lt. Η εφαρμογή του γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του φυτοπροστατευτικού προϊόντος με το οποίο συνδυάζεται, αφού το ERIPHANY 15 SL δεν χρησιμοποιείται μόνο του • **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το φάρμακο που θα εφαρμόσουμε σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ERIPHANY 15 SL μπαίνει τελευταίο στο ψεκαστικό διάλυμα, υπό συνεχή ανάδευση. **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ:** Ακολουθούνται οι οδηγίες του φυτοπροστατευτικού προϊόντος με το οποίο συνδυάζεται. **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια, στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

**Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη  
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης**

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:** Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**Πρώτες Βοήθειες-Αντίδοτο:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό σε θέση ανάπαυσης. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**

*Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.  
Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.*

Αρ. Παρτίδας: Βλέπε φιάλη  
Ημ. Παραγωγή:

